

Wie PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen aussieht und Inhalt der Packung

Klare, gelbbraune Flüssigkeit, ein Niederschlag ist möglich. Braunglasflasche mit Aluminiumverschluß und Kunststoffdichtung.

Packungsgrößen: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber:

Richard Bittner AG, Reisnerstraße 55-57, 1030 Wien
Tel.-Nr.: +43/(0)1-50 30 972, Fax-Nr.: +43/(0)1-50 30 972-40
e-mail: office.vienna@richard-bittner.com

Hersteller:

Richard Bittner AG, Ossiacherstraße 7, A-9560 Feldkirchen
Tel.-Nr.: +43/(0)4276-37 888-0, Fax-Nr.: +43/(0)4276-37 131
e-mail: office@richard-bittner.com

Z.Nr.: 1-21915

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Oktober 2009.

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen

Wirkstoffe: Kampfer, Flüssigextrakt aus 26 Arzneipflanzen (standardisiert auf einen Gehalt an ätherischem Öl)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen beachten?
3. Wie ist PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST PERVIVO® – LÖSUNG ZUM EINNEHMEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Anwendungsgebiete

- bei leichten Verdauungsbeschwerden
- in der Rekonvaleszenz

PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen enthält bekannte Heilpflanzen. Die enthaltenen Bitterstoffe, Polysaccharide und ätherischen Öle verbessern die Mobilität im Magen-Darmtrakt und unterstützen die Verdauung. Blähungen und Völlegefühl werden gelindert, die Bildung von Verdauungssäften wird angeregt, die Entleerung der Gallenblase wird unterstützt. PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen hat eine aufbauende Wirkung in der Rekonvaleszenz. Es liegen Hinweise auf eine positive Beeinflussung des Immunsystems vor.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PERVIVO® – LÖSUNG ZUM EINNEHMEN BEACHTEN?

PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen darf nicht eingenommen werden,

- von Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- von Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei schweren Lebererkrankungen, bei Verschluss der Gallenwege, bei Gallensteinleiden und bei frischen Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren.
- wenn Sie überempfindlich gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen ist erforderlich, PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen enthält pro Einzeldosis ca. 1,6 g Alkohol und darf daher von Kindern, Schwangeren, Alkoholkranken, Epileptikern, Lebererkrankten und Menschen mit Gehirnverletzungen nicht eingenommen werden.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens ärztliche Beratung erforderlich.

Bei Einnahme von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen mit anderen Arzneimitteln

sind keine Wechselwirkungen bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei der Einnahme von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

keine besonderen Anforderungen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Aufgrund des Alkoholgehaltes wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen enthält pro Einzeldosis ca. 1,6 g Alkohol. Aufgrund des Alkoholgehaltes kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei gleichzeitigem Alkoholgenuss oder im Zusammenwirken mit Arzneimitteln, die ihrerseits das Reaktionsvermögen beeinträchtigen können.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen

Dieses Arzneimittel enthält 40 % vol Alkohol. 1 ml enthält ca. 0,32 g Alkohol.

3. WIE IST PERVIVO® – LÖSUNG ZUM EINNEHMEN ANZUWENDEN?

Nehmen Sie PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene: nehmen Sie 2 – 3 x täglich 1 Teelöffel (5 ml) unverdünnt bzw. verdünnt in etwas Wasser oder Kräutertee ein.

In der Rekonvaleszenz wird die Einnahme 15 bis 30 Minuten vor den Mahlzeiten, bei leichten Verdauungsbeschwerden wird die Einnahme nach den Mahlzeiten empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet. Aufgrund des Alkoholgehaltes kann es zu Ethanol-Intoxikationserscheinungen kommen.

Wenn Sie die Einnahme von PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern holen Sie die Einnahme sobald als möglich nach. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

PERVIVO® – Lösung zum Einnehmen kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen. Gelegentlich können Übelkeit oder Sodbrennen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST PERVIVO® - LÖSUNG ZUM EINNEHMEN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über Raumtemperatur (bis 30°C) lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

100 ml Pervivo® – Lösung zum Einnehmen enthalten: Kampfer 64,8 - 79,2 mg und 8,0 g Flüssigextrakt aus Zitwerwurzel 138,0 mg, Manna 136,0 mg, Angelikawurzel 136,0 mg, Theriak 97,0 mg, Myrrhe 70,0 mg, Eberwurzel 68,0 mg, Enzianwurzel 50,0 mg, Muskatnuss 28,0 mg, Süßholzwurzel 17,0 mg, Bitterkleblatt 12,0 mg, Kalmuswurzel 4,7 mg, Sternanis 4,6 mg, Curacaoschalen 3,8 mg, Wermutkraut 3,5 mg, Bitterorangenschale 3,1 mg, Gewürznelke 3,0 mg, Alantwurzel 2,0 mg, Kubeben 1,7 mg, Ingwerwurzel 1,5 mg, Kardobenediktenkraut 1,5 mg, Königskerzenblüte 1,4 mg, Galgant 1,4 mg, Tausendguldenkraut 1,3 mg, Süßorangenschalen 1,1 mg, Moschusschafgarbenkraut 0,6 mg, Veilchenwurzel 0,5 mg, Auszugsmittel Ethanol 43,4% (v/v). 100 ml Pervivo® – Lösung zum Einnehmen sind standardisiert auf einen Gehalt an ätherischem Öl (Terpenoide und Phenylpropane) von 5,0 – 10,0 mg, Bitterwert: min. 100

Die sonstigen Bestandteile sind: Zuckercouleur E150, Alkohol 96% (v/v) und gereinigtes Wasser. 1 ml enthält ca. 0,32 g Alkohol.